

Uteblivna doser och behandlingsuppehåll

Rutin vid läkemedelsvägran, missade doser och uppehåll i behandling med psykofarmaka. Syftet är att säkerställa bedömning och säker fortsatt behandling.

När en dos inte har tagits

Personalen kontaktar sjuksköterskan när en dos uteblivit eller det är osäkert om patienten har tagit den. Ange läkemedel, dos, ordinarie tid, senaste säkert tagna dos och orsaken om den är känd. Signera inte dosen som given.

Sjuksköterskan bedömer patientens tillstånd och kontrollerar ordinationen samt läkemedlets anvisningar för glömd dos. Ge inte dubbel dos som kompensation. Ge inte en extra dos efter kräkning eller vid osäkert intag utan bedömning. Vid oklarhet kontaktas läkare före berörd dos.

När patienten avstår från läkemedel

Fråga lugnt om orsaken, exempelvis biverkningar, sväljsvårigheter eller önskemål att avsluta behandlingen. Ge begriplig information om behandlingens syfte och följderna av ett avbrott. Respektera patientens ställningstagande. Läkemedel får inte ges med tvång eller döljas i mat för att kringgå ett nej inom boendets ordinarie vård.

Sjuksköterskan informerar läkaren vid upprepad vägran eller när patienten vill avsluta behandlingen. Läkaren bedömer alternativ, eventuell nedtrappning och uppföljning tillsammans med patienten.

När läkare ska kontaktas

Kontakta läkare samma dag vid upprepade uteblivna doser, oklar uppehållslängd, försämrat psykiskt tillstånd eller risk för abstinens. Vid missad depåinjektion kontaktas läkare för besked om nästa dos. Invänta inte rond när en tidigare bedömning behövs.

Vid kramper, medvetslöshet eller omedelbar fara för patientens eller andras liv: ring 112. Vid tydlig psykisk försämring utan omedelbar fara behövs skyndsam läkarbedömning.

Särskilt vid återinsättning

- Klozapin: Har mer än två dygn gått sedan senaste dosen får tidigare dos inte återupptas. Kontakta läkare före återinsättning. Enligt produktresumén återinsätts behandlingen med 12,5 mg en eller två gånger första dagen. Läkaren ordinerar fortsatt upptrappning och tar ställning till blodprovskontroller.
- Lamotrigin: Efter behandlingsuppehåll bedömer läkaren behovet av ny upptrappning före återinsättning. Tidigare underhållsdos ska inte återupptas på eget initiativ. Uppehållets längd och övriga läkemedel påverkar bedömningen. Kontakta läkare om behandlingen avbrutits på grund av hudutslag.
- Bensodiazepiner: Abrupt avbrott efter regelbundet bruk kan ge allvarlig abstinens, inklusive kramper. Kontakta läkare samma dag för fortsatt behandling.

Även övriga läkemedel bedöms individuellt efter uppehåll. Läkaren dokumenterar dosering, eventuell upptrappning, kontroller och tid för uppföljning.

Dokumentation och rond

Dokumentera uteblivna doser, orsak, symtom, kontakter och beslut. Hanteringsfel rapporteras som avvikelser. Enstaka missade doser som är bedömda och åtgärdade utan kvarstående risk kan följas upp vid rond. Återkommande problem tas upp för behandlingsöversyn.

**Kontakt**

samuel@psykab.se eller SMS 073-399 44 12. Återkoppling normalt inom fyra timmar under vardagars arbetstid. Vid brådskande behov när läkaren inte är tillgänglig: ring 1177 för hänvisning. Vid allvarligt akut tillstånd: ring 112. Invänta då inte svar på mejl eller SMS.

Referenser

Patientlag (2014:821), 4 kap. Samtycke.

Läkemedelsverket. Glömma att ta sin medicin eller ta för mycket.

Region Jönköpings län. Iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel.

Fass. Clozapine Accord - återinsättande av behandling.

Fass. Lamictal - återinsättning av behandling.

Fass. Oxascand - utsättning och abstinens.